

Lista de mantenimiento por cultivos (Plenitud PR)

1. Kale, Collard, Acelga
 - a. *Detalles de siembra:*
 - i. 4 semanas en bandeja. 1 semilla por celda
 - ii. 18in x 18in
 - iii. Requiere suelo bien trinchado, suelto y con una buena capa de composta 1-2 pulgadas
 - iv. Echar mezcla de gallinaza, composta y cal en el hoyo al sembrar
 - v. Regar bastante todos los días hasta que se establezcan
 - vi. Poner mulch en suelo antes de sembrar
 - vii. Si el lugar está muy caliente o hay mucha plaga, poner en tiestos antes de transplantar en suelo para que lleguen al campo más fuertes.
 - b. *Mantenimiento*
 - i. Una aplicación mensual de gallinaza/cal/composta
 - ii. Una aplicación semanal de microorganismos (algún biofermento)
 - iii. Al cosechar se recortan 2 - 3 hojas por semana, solo hojas grandes, eliminar hojas viejas, descoloridas y tallos que siguen en la planta de las hojas cosechadas.
 - iv. Evitar exceso de agua con la Acelga
 - v. Velar por gusanos, especialmente en la acelga.
2. Mixta
 - a. *Detalles de siembra:*
 - i. Soltar bien el banco y aplicar 1" composta, romper terrones con power harrow y pasar rastrillo para eliminar los que queden y nivelar bien el banco
 - ii. Puedes sembrar en un banco recién cosechado de otro cultivo rápido sin tener que echar composta de nuevo.
 - iii. Siembra directa. Usar jang seeder con roller: x-24, gears 14F - 9R
 - b. *Mantenimiento*
 - i. Remover hojas muertas del banco con rastrillo luego de cosechar
 - ii. Cosechar completa cada 1-2 semanas dependiendo de la temporada o temperatura (Si hace calor, se cosecha cada semana)
 - iii. Evitar exceso de agua
3. Nabo y Rábano
 - a. *Detalles de siembra:*
 - i. Soltar bien el banco y aplicar 1" composta, romper terrones con power harrow y pasar rastrillo para eliminar los que queden y nivelar bien el banco
 - ii. Puedes sembrar en un banco recién cosechado de otro cultivo rápido sin tener que echar composta de nuevo.
 - iii. Siembra directa. Usar jang seeder
 1. **Rábano con roller F-24, gears 14F-9R
 2. **Nabo con roller Y-24, gears 11F-11R
 - b. *Mantenimiento*
 - i. Entresacar las plantas a 2 pulgadas luego de 2 semanas de germinar
 - ii. Aterrar 1-2 semanas al momento de entresacar o después
4. Albahaca
 - a. *Detalles de siembra:*
 - i. 4 semanas en bandeja. 1 semilla por celda
 - ii. 12in x 9in
 - iii. Requiere suelo bien trinchado, suelto y con una buena capa de composta 1-2 pulgadas
 - iv. Echar mezcla de gallinaza, composta y cal en el hoyo al sembrar
 - v. Regar bastante todos los días hasta que se establezcan
 - vi. Si el lugar está muy caliente o hay mucha plaga, poner en tiestos antes de transplantar en suelo para que lleguen al campo más fuertes.
 - b. *Mantenimiento*
 - i. Una aplicación semanal de microorganismos (algún biofermento). Evitar abono de origen marino porque puede dejar un sabor en la hoja.
 - ii. Se cosechan tallos con varias hojas.
 - iii. Velar por hongos.
5. Cebollín / cilantrillo
 - a. *Detalles de siembra:*

- i. 42 días en bandeja, 5 semillas por celda
 - ii. 2in x 2in
 - iii. Soltar bien el banco y aplicar 1" composta, romper terrones con power harrow y pasar rastrillo para eliminar los que queden y nivelar bien el banco
 - iv. Puedes sembrar en un banco recién cosechado de otro cultivo rápido sin tener que echar composta de nuevo.
 - b. *Mantenimiento*
 - i. Desyerbo a los 10 – 14 días
 - ii. Aterrizar si es necesario.
6. Berenjena
- a. *Detalles de siembra:*
 - i. 3 semanas en bandeja. 1 semilla por celda
 - ii. 18in entre planta
 - iii. Requiere suelo bien trinchado, suelto y con una buena capa de composta 1-2 pulgadas
 - iv. Echar mezcla de gallinaza, composta y cal en el hoyo al sembrar
 - v. Regar bastante todos los días hasta que se establezcan
 - vi. Poner mulch en suelo antes de sembrar
 - vii. Si el lugar está muy caliente o hay mucha plaga, poner en tiestos antes de transplantar en suelo para que lleguen al campo más fuertes.
 - b. *Mantenimiento*
 - i. Una aplicación mensual de gallinaza/cal/composta
 - ii. Una aplicación semanal de microorganismos (algún biofermento)
 - iii. Al cosechar se recortan 2 - 3 hojas por semana, solo hojas grandes, eliminar hojas viejas, descoloridas y tallos que siguen en la planta de las hojas cosechadas.
 - iv. Velar por gusanos
 - v. Se ponen estacas y una fila de hilo cuando tengan 16 in de alto. Se pone otra fila de hilo cada vez que la planta crezca 12 in.
 - vi. Se cosechan los frutos dos veces en semana cuando tienen el tamaño adecuado.
7. Tomate
- a. *Detalles de siembra:*
 - i. 3 semanas en bandeja. 1 semilla por celda
 - ii. 24in entre planta
 - iii. Requiere suelo bien trinchado, suelto y con una buena capa de composta 1-2 pulgadas
 - iv. Echar mezcla de gallinaza, composta y cal en el hoyo al sembrar
 - v. Regar bastante todos los días hasta que se establezcan
 - vi. Poner mulch en suelo antes de sembrar
 - vii. Si el lugar está muy caliente o hay mucha plaga, poner en tiestos antes de transplantar en suelo para que lleguen al campo más fuertes.
 - viii. Cuando se siembran se pueden enterrar hasta la primera rama o cotiledón para que eche más raíces.
 - b. *Mantenimiento*
 - i. Una aplicación mensual de gallinaza/cal/composta
 - ii. Una aplicación semanal de microorganismos (algún biofermento)
 - iii. Al cosechar se recortan 2 - 3 hojas por semana, solo hojas grandes, eliminar hojas viejas, descoloridas y tallos que siguen en la planta de las hojas cosechadas.
 - iv. Velar por hongos
 - v. Se ponen estacas y una fila de hilo cuando tengan 16 in de alto. Se pone otra fila de hilo cada vez que la planta crezca 10 in.
 - vi. Se cosechan los frutos dos veces en semana cuando tienen el tamaño adecuado.
 - vii. Eliminar yemas cada 1 o 2 semanas
 - viii. Eliminar hojas enfermas o muertas cada 2 – 3 semanas.
8. Pimiento
- a. *Detalles de siembra:*
 - i. 3 semanas en bandeja. 1 semilla por celda
 - ii. 18in entre planta
 - iii. Requiere suelo bien trinchado, suelto y con una buena capa de composta 1-2 pulgadas
 - iv. Echar mezcla de gallinaza, composta y cal en el hoyo al sembrar
 - v. Regar bastante todos los días hasta que se establezcan
 - vi. Poner mulch en suelo antes de sembrar

- vii. Si el lugar está muy caliente o hay mucha plaga, poner en tiestos antes de transplantar en suelo para que lleguen al campo más fuertes.
 - b. *Mantenimiento*
 - i. Una aplicación mensual de gallinaza/cal/composta
 - ii. Una aplicación semanal de microorganismos (algún biofermento)
 - iii. Al cosechar se recortan 2 - 3 hojas por semana, solo hojas grandes, eliminar hojas viejas, descoloridas y tallos que siguen en la planta de las hojas cosechadas.
 - iv. Velar por gusanos
 - v. Se ponen estacas y una fila de hilo cuando tengan 16 in de alto. Se pone otra fila de hilo cada vez que la planta crezca 12 in.
 - vi. Se cosechan los frutos dos veces en semana cuando tienen el tamaño adecuado.
 - vii. Se cortan las primeras flores en la primera ramificación (la V) y todas las hojas por debajo de esa ramificación.
9. Remolacha
- a. *Detalles de siembra:*
 - i. 35 días en bandeja. 2-3 semilla por celda
 - ii. 5in x 11in
 - iii. Soltar bien el banco y aplicar 1" composta, romper terrones con power harrow y pasar rastrillo para eliminar los que queden y nivelar bien el banco
 - iv. Regar bastante todos los días hasta que se establezcan
 - b. *Mantenimiento*
 - i. Una aplicación de gallinaza/cal/composta
 - ii. Una aplicación semanal de microorganismos (algún biofermento)
 - iii. Se cosecha la planta entera
10. Frisé
- a. Desyerbo a los 10 – 12 días
 - b. Se pueden poner blanching bells 7 – 10 días antes de la cosecha
11. Pole beans
- a. *Detalles de siembra:*
 - i. Siembra directa. 12in x 12in
 - ii. Requiere suelo bien trinchado, suelto y con una buena capa de composta 1-2 pulgadas
 - iii. Regar bastante todos los días hasta que se establezcan
 - b. *Mantenimiento*
 - i. Una aplicación semanal de microorganismos (algún biofermento)
 - ii. Una aplicación de gallinaza/cal/composta
 - iii. Velar por hongos y áfidos.
 - iv. Establecer unos trellis o cordones.
 - v. Se cosechan los frutos dos veces en semana cuando tienen el tamaño adecuado.
12. Melón / calabaza / calabaza de cera
- a. *Detalles de siembra:*
 - i. 2 semanas en bandeja. 1 semilla por celda o siembra directa.
 - ii. 30in entre planta
 - iii. Requiere suelo bien trinchado, suelto y con una buena capa de composta 1-2 pulgadas
 - iv. Echar mezcla de gallinaza, composta y cal en el hoyo al sembrar
 - v. Regar bastante todos los días hasta que se establezcan
 - vi. Poner mulch en suelo de sembrar o después que germinen si es siembra directa
 - vii. Si el lugar está muy caliente o hay mucha plaga, poner en tiestos antes de transplantar en suelo para que lleguen al campo más fuertes.
 - b. *Mantenimiento*
 - i. Una aplicación mensual de gallinaza/cal/composta
 - ii. Una aplicación semanal de microorganismos (algún biofermento)
 - iii. Velar por hongos
 - iv. Cuando tenga 4 hojas se poda para promover la ramificación
13. Brécol
- a. Aplicación de abono alto en nitrógeno en el momento de la siembra y a los 14 días donde se incorpora, se desyerba y se puede poner viruta o heno
14. Otras actividades
15. Mantenimiento de baterías del sistema solar del taller – mensual